

Patientvejledning efter afskrab / curettage / hudbiopsi / hudprøve

Til dig der har fået fjernet hudkræft eller lignende

Du har fået lavet en curettage / hudbiopsi – det vil sige en dyb hudafskrabning og efterfølgende er der evt. blevet brændt på området for at få blødningen til at stoppe.

Hvis det behandlede område begynder at bløde, skal du påsætte et stykke rent gaze eller lignende og trykke fast på området i 15 min. Hvis blødningen herefter ikke er ophørt skal du kontakte hudlægeklinikken eller anden læge/skadestuen.

Efter et sådant indgreb er der altid en risiko for betændelse. Det er vigtigt, at du holder det behandlede område tørt og rent. Du skal gerne dagen efter indgrebet vaske såret med vand og sæbe og duppe området tørt med et rent håndklæde. Du skal kun påsætte plaster, hvis det væsker meget ellers er det bedst uden. Du kan benytte klorhexidin creme dagligt for at forebygge betændelse.

Hvis der kommer hævelse, smerter og rødme i området kan der være tilstødt en betændelse og du skal da kontakte hudlægeklinikken eller anden læge for at få vurderet om der skal gives antibiotika.

Det er ikke usædvanligt at der går 3- 4 uger inden såret er helet. Det behandlede område kan være ømt efterfølgende ligesom et blå mærke, men ømheden fortager sig.

Hudlægeklinikken Lillebælt 2021